

**Б. ЛИСТОВКА**

## Листовка: информация за потребителя

### **БРОНХОСТОП НАЙТ 187,5 mg/136,4 mg/150 mg перорален разтвор** **BRONCHOSTOP® NITE 187.5 mg/136.4 mg/150 mg oral solution**

сух екстракт от корени Лечебна ружа/сух екстракт от цветовете Липа/сух екстракт от листа Теснолист  
живовлек

*Althaeae radix extractum siccum/Tiliae flos extractum siccum/Plantaginis lanceolatae folium, extractum siccum*

**Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.**

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
- Ако след 5 дни (3 дни при деца) не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### **В тази листовка:**

1. Какво представлява *БРОНХОСТОП НАЙТ* и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете преди да приемете *БРОНХОСТОП НАЙТ*
3. Как да приемате *БРОНХОСТОП НАЙТ*
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате *БРОНХОСТОП НАЙТ*
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

#### **1. Какво представлява *БРОНХОСТОП НАЙТ* и за какво се използва**

Полизахаридите, съдържащи се в корена от лечебна ружа и живовлек, облекчават дразненето в устата или фаринкса и съответно поривите на кашлица през деня, както и през нощта. Съставките на липата подпомагат изпотяването и по този начин облекчават настинките, протичащи с повишена температура.

Традиционен растителен лекарствен продукт за облекчаване на суха кашлица, както и на нощна кашлица, дразнене на фаринкса и за подпомагане на изпотяването при леко повишена температура, като ранни симптоми на обикновена настинка.

Този продукт е традиционен растителен лекарствен продукт за употреба при определените показания, основаващи се изцяло на дългосрочна употреба.

*БРОНХОСТОП НАЙТ* е предназначен за употреба при възрастни, юноши и деца от 4 годишна възраст.

Ако след 5 дни (3 дни при деца) не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### **2. Какво трябва да знаете преди да приемете *БРОНХОСТОП НАЙТ***

##### **Не приемайте *БРОНХОСТОП НАЙТ***

- ако сте алергични към лечебна ружа, липа или теснолист живовлек или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

### **Предупреждения и предпазни мерки**

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете *БРОНХОСТОП НАЙТ*.

Ако симптомите се влошат по време на употребата на това лекарство, или ако се появи задух, висока температура или гнойни храчки, трябва да се консултирате с лекар.

Абсорбцията при едновременно прилагани лекарства може да се забави. Като предпазна мярка, този лекарствен продукт не трябва да се приема 30 минути до 1 час преди или след приема на други лекарства.

### **Деца**

Употребата при деца под 4 годишна възраст не се препоръчва, поради липса на достатъчно данни.

### **Други лекарства и *БРОНХОСТОП НАЙТ***

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Не са известни взаимодействия.

Не са провеждани проучвания за взаимодействия.

### **Бременност, кърмене и фертилитет**

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Безопасността по време на бременност и кърмене не е установена. При липса на достатъчно данни, употребата по време на бременност и кърмене не се препоръчва.

### **Шофиране и работа с машини**

Не са провеждани проучвания на ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

### ***БРОНХОСТОП НАЙТ* съдържа ксилитол**

Това лекарство съдържа 11,04 g ксилитол в максималната дневна доза (60 ml). Може да има слабително действие. Енергийна стойност 2,4 kcal/g ксилитол.

### ***БРОНХОСТОП НАЙТ* съдържа метил-4-парахидроксибензоат и пропил-4-парахидроксибензоат.**

Тези консерванти могат да причинят алергични реакции (вероятно от забавен тип).

### ***БРОНХОСТОП НАЙТ* съдържа пропиленгликол и бензилов алкохол.**

Това лекарство съдържа 13,6 mg пропиленгликол и 0,002 mg бензилов алкохол във всяка доза (15 ml). Бензиловият алкохол може да причини алергични реакции.

## **3. Как да приемате *БРОНХОСТОП НАЙТ***

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

#### *Възрастни и юноши от 12 годишна възраст:*

15 ml (използвайки предоставената мерителна чашка) до 4 пъти дневно (максимална дневна доза до 60 ml). Последната доза трябва да се приеме непосредствено преди лягане.

#### *Деца на възраст от 4 до 11 години:*

7,5 ml (използвайки предоставената мерителна чашка) 3 до 4 пъти дневно (максимална дневна доза до 30 ml). Последната доза трябва да се приеме непосредствено преди лягане.

Начин на приложение:

За перорално приложение.

Приемайте **БРОНХОСТОП НАЙТ** неразреден. Препоръчва се да се избягва приемането на течности от 30 мин. до 1 час след прием.

Предоставена е мерителна чашка.

Продължителност на приложение:

Ако след 5 дни (3 дни при деца) не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

#### **Употреба при деца**

Поради липса на достатъчно данни, не се препоръчва употребата при деца под 4 години.

#### **Ако сте приели повече от необходимата доза *БРОНХОСТОП НАЙТ***

Не са докладвани случаи на предозиране.

#### **Ако сте пропуснали да приемете *БРОНХОСТОП НАЙТ***

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

### **4. Възможни нежелани реакции**

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Не са известни нежелани реакции.

#### **Съобщаване на нежелани реакции**

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

тел.: +359 2 8903417

уебсайт: [www.bda.bg](http://www.bda.bg).

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

### **5. Как да съхранявате *БРОНХОСТОП НАЙТ***

След отваряне, да не се съхранява при температура над 25°C. Съхранявайте бутилката плътно затворена след употреба. Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета и картонената опаковка след “Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец. След отваряне, използвайте в рамките на 2 месеца.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

## 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

### Какво съдържа **БРОНХОСТОП НАЙТ**:

- Активните вещества са:  
15 ml (= 16,3 g) перорален разтвор съдържат:
  - 187,5 mg сух екстракт от корени Лечебна ружа (*Althaea officinalis* L., radix), (7-9:1), екстрагент: вода
  - 136,4 mg сух екстракт от цвят Липа (*Tilia cordata* Miller, *Tilia platyphyllos* Scop., *Tilia x vulgaris* Heune, flos или техни смеси) (3-8:1), екстрагент: вода
  - 150 mg сух екстракт от листа Теснолист живовлек (*Plantago lanceolata* L., folium) (4-6:1), екстрагент: вода
- Други съставки са: малтодекстрин, колоиден безводен силициев диоксид, глицерол, ксилитол (E 976), метил-4-хидроксibenзоат (E 218), пропил-4-хидроксibenзоат (E 216), лимонена киселина монохидрат, ксантанова гума, аромат ягода (съдържащ бензилов алкохол (E 1519), пропиленгликол (E 1520)), пречистена вода.

### Как изглежда **БРОНХОСТОП НАЙТ** и какво съдържа опаковката

**БРОНХОСТОП НАЙТ** е кафяв, непрозрачен перорален разтвор. Предлага се в кафяви стъклени бутилки с капачка с винт в опаковки от 120 ml, 200 ml и 240 ml. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара. Приложената мерителна чашка със скала между 2,5 ml и 20 ml улеснява прецизното измерване на препоръчителното количество.

### Притежател на разрешението за употреба и производител

#### Притежател на разрешението за употреба:

Kwizda Pharma GmbH  
Effingergasse 21, 1160 Vienna  
Австрия

#### Производител:

Kwizda Pharma GmbH  
Effingergasse 21, 1160 Vienna  
Австрия

Това лекарство е разрешено в държавите-членки на Европейското икономическо пространство под следните имена:

Австрия:	BRONCHOSTOP Erkältungs- und Hustensaft
България:	БРОНХОСТОП НАЙТ 187,5 mg/136,4 mg/150,0 mg перорален разтвор
Чехия:	Bronchostop Trio
Естония:	Broncophen Nite
Хърватия:	Bronchostop Trio oralna otopina
Унгария:	Bronchostop Trio köhögés és megfázás elleni belsőleges oldat
Рукъния:	Bronchostop Trio pentru Tuse și Răceală soluție orală
Словения:	Slez, trpotec in lipa Bronchostop peroralna raztopina
Словакия:	Bronchostop deň a noc perorálny roztok

За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба.

МагнаФарм България ЕАД  
телефон: +359 2 890 39 13

Дата на последно преразглеждане на листовката октомври 2025 г.